Continue

La Clorfenamina o Clorfeniramina es un antialérgico, del grupo de los antihistamínicos que bloquea los efectos de la histamina responsable de los síntomas an casos de alergia. La clorfenamina logra reducir o eliminar esos síntomas. ¿Para qué sirve la clorfenamina? La Clorfenamina (o clorferinamina)es un inhibidor de los receptores de la histamina empleado en casos de alergias por la ingesta de medicamentos, conjuntivitis alérgica, rinitis vasomotora, fiebre del heno y reacciones alérgicas de irritación o erupciones en la piel. La histamina provoca los síntomas de una reacción alérgica como estornudos, ojos rojos y llorosos, inflamación, erupciones en la piel y flujo nasal constante.(Referencia) También se emplea para contrarrestar los síntomas por reacciones alérgicas a alimentos, picaduras de insectos o productos cosméticos. Calma la rinitis, la urticaria, el estornudo, la comezón en oídos, nariz, ojos y garganta, consecuencias de los cuadros alérgicos. ¿Para qué sirve la clorfenamina compuesta? En la clorfenamina compuesta, se combinan agregan 2 medicamentos a la misma tableta. Fenilefrina y Acetaminofen o paracetamol. Esta combinación permite controlar los síntomas de resfriado común con más rapidez, en una sola presentación. La clorfeniramina viene en forma maleato en todas sus presentaciones comerciales, tabletas, cápsulas o jarabe. El maleato es un grupo funcional químico, derivado de una sal de ácido málico que se enlaza a alguna molécula principal. En teste caso se enlaza a la clorfenamina. por sí solo no tienen efecto alguno en el organismo. Sirve para mantener estables principios activos en diferentes presentaciones farmacéuticas. El jarabe de clorfenamina cumple con las mismas funciones que las tabletas y cápsulas. La presentación en jarabe facilita la dosificación en niños y la ingestión en personas mayores o con dificultad para trabar tabletas. ¿En que presentación se encuentra la clorfenamina? La Clorfenamina se halla en jarabe, comprimidos orales o vía parenteral. Se metaboliza en el hígado y tiene un tiempo de vida en la sangre de hasta 12 horas. Es desechada por la orina. ¿Cuál es el nombre comercial de la clorfenamina? En México, se encuentra el Desenfriol-D, que contiene 2 gramos de clorfenamina, 500 mgr de paracetamol y 5 mg de fenilefrina. También se encuentra el Theraflu, que contiene Clorfenamina, paracetamol, pseudoefedrina y dextrometorfano. También la venden en su forma genérica: clorfenamina ¿Qué dosis tomar de clorfenamina? La dosis dependerá de la condición, peso y edad del paciente. También al tipo de presentación y sus miligramos. En adultos, se precisa usualmente clorfenamina maleato en tabletas de 4 mg, máximo de 24 mgr diarios, pero será el médico el que precise la cantidad a ingerir. La clorfenamina puede conseguirse sola o simple, o bien clorfenamina compuesta que sirve en casos de congestión nasal y cefalea o fiebre, tiene paracetamol y cafeína en la misma tableta. ¿Cómo funciona la clorfenamina en el cuerpo? La sustancia bloquea la histamina, amina idazólica que activa los síntomas de una reacción alérgica en el organismo y detiene los efectos de la acetilcolina, con lo que se “secan” fluidos corporales reduciendo los ojos llorosos o el flujo nasal constante. (Referencia) La Clorfenamina reduce los síntomas de la gripa, pero no la cura. Efectos secundarios de la clorfenamina La mayoría de los pacientes no manifiestan efectos secundarios al compuesto químico. En los casos de que sí ocurran, suelen disminuir progresivamente con la adaptación del organismo a la sustancia. La Clorfeniramina puede agravar el cuadro de tos con flemas en pacientes con asma crónica, por lo que solo será ingerido si es recetado por un doctor. Se debe tener precauciones en su uso en embarazadas. Será empleado bajo supervisión médica durante la lactancia. (Referencia) Un estudio de la Universidad de Manitoba alertó del cuidado de este medicamento en pacientes ancianos. (Referencia) Igualmente en menores de 3 años se deb tomar precauciones. La Universidad de Manitoba (Canadá) igualmente reportó las diferencias de los efectos en niños. (Referencia) El siguiente cuadro comprende algunos de los efectos secundarios de la Clorfenamina y qué hacer ante ellos. Efectos Secundarios Comunes ¿Qué hacer en caso de experimentarlo? Sensación de mareo o somnolencia y visión borrosa Evitar conducir cualquier tipo de vehículo y no usar herramientas o maquinaria hasta sentirse mejor. No ingerir alcohol durante el tratamiento. Dolor de cabeza Toma abundantes líquidos y consultar al médico sobre el uso de algún medicamento para reducir el dolor. Si el dolor persiste, consultar al médico y suspender el uso del medicamento. Sequedad de boca, nariz o garganta Comer algún dulce o masticar goma de mascar libre de azúcar. Tomar abundante líquido o chupar cubos de hielo Falta de concentración, molestias gástricas, dificultad para orinar, falta de coordinación, irritabilidad (particularmente en niños) Hablar con el médico en caso de que estos síntomas se agraven o no disminuyan con el tiempo. Se suspenderá el empleo del compuesto y se asistirá al médico con los siguientes síntomas: Falta de aliento. Inusual debilidad. Cambios de humor. Temblores o convulsiones. Poca micción o dejar de orinar. Aparición de moretones o sangrado. Cambios o aceleración en la frecuencia cardiaca. Los principales efectos secundarios están a nivel del Sistema Nervioso Central como lo demuestran varias publicaciones científicas. (Referencias) Se buscará ayuda médica inmediata en casos de urticaria o erupción cutánea, hinchazón del rostro, labios, lengua, garganta o en dificultad para respirar. Lo ideal será discutir con el médico si los beneficios del medicamento son mayores a los potenciales efectos adversos. Los pacientes con insuficiencia hepática y problemas cardíacos no consumirán la Clorfeniramina, pues en la segunda de estas condiciones puede provocar taquicardia, sudoración, temblores, ansiedad, hipotensión y arritmia. No se tomará alcohol bajo tratamiento con el fármaco porque deprime el sistema nervioso y potencia los efectos sedantes, causando una potente somnolencia. La Clorfeniramina no puede ser ingerida por cualquier paciente porque causa efectos colaterales de acuerdo a la edad, peso, condiciones de vida, tipo de padecimiento y los medicamentos consumidos. Lo más responsable será acudir primero al médico. ¿Clorfenamina da sueño? Sí. A pesar que individuos pueden tomarla para dormir, no es su uso aceptado para ese fin. Puede provocar somnolencia o mareos en personas susceptibles a la sustancia, por lo que no se conducirá ninguna máquina, ni se harán actividades que demanden concentración o estar alerta, durante su consumo. Se limitará el uso de sustancias que provoquen somnolencia o la ingesta de alcohol mientras se esté bajo tratamiento con Clorfenamina. Levantarse despacio después de estar sentado o acostado minimizará los posibles mareos o aturdimientos. Se ha reportado en la literatura la importancia de evitar su uso durante actividades que ameritan estar alerta y despierto. (Referencia) ¿Sirve la clorfenamina para dormir? Este medicamento produce somnolencia, pensamiento lento y disminuye las reacciones reflejas del cuerpo. En caso de tener problemas del sueño, se beneficia de tomar este tipo de medicamentos. Sin embargo, su uso principal debe ser como antialérgico y por tiempo limitado. No debe usarse como inductor del sueño solamente ni tomarlo en forma rutinaria para este fin. Lee nuestra guía sobre los 5 alimentos que sirven para tratar el insomnio y para mejorar el sueño Dosis de la clorfenamina La medicina se administrará según lo indicado por el médico. Su ingesta no será por más tiempo del recetado que por lo general es por corto tiempo y dependiendo de la presentación administrada. (Referencia) Las siguientes son las dosis habituales: Niños de un año a 23 meses: un mg (2.5 ml) dos veces al día, preferiblemente en las mañanas y en las tardes. Niños de 2 a 5 años: un mg (2.5 ml) cada 4 a 6 horas. No exceder más de 6 dosis (6 mg) al día. Niños de 6 a 11 años: 2 mg (5 ml) cada 4 a 6 horas. No exceder más de 6 dosis (12 mg) al día. Adultos y niños mayores de 12 años: 4 mg (una tableta o 10 ml) cada 4 a 6 horas. No exceder más de 6 dosis (24 mg) al día con menos de 65 años o más de 3 dosis (12mg) cada 24 horas con más de esa edad. ¿Cómo tomar clorfenamina maleato? El medicamento no será ingerido por más de 7 días seguidos. El paciente consultará con el médico si los síntomas no disminuyen, no hay mejorías o se manifiestan dolores de cabeza, erupción cutánea o fiebre, después de ese período. La Clorfenamina se tomará antes o después de los alimentos. Si el tratamiento es con solución oral se mediará la cantidad en una cuchara específica para medicamentos, no con una de cocina. Si la caja no la tiene, se le pedirá al farmacéutico. Las tabletas de liberación prolongada no se masticarán, romperán o aplastarán. Serán tragadas completas. Fraccionarla puede provocar que un porcentaje alto de la sustancia se libere al mismo tiempo. Dosis de la clorfenamina compuesta La clorfenamina compuesta, contiene 4 mg de se componente principal, con fenilefrina 5mg, cafeína 25 mg y paracetamol 500 mg. La dosis sugerida de esta Clorferamina compuesta de 2 veces al día. No se debe exceder esa dosis ¿Cómo tomar clorfenamina compuesta? Se debe tomar en caos de resfriado común, con muchos síntomas nasofaringeos y dolor de cabeza, al menos 2 veces al día, por 7 días máximo. Puede suspenderlo al mejorar los síntomas. ¿Para qué sirve amantadina con clorfenamina y paracetamol? En México esta combinación se conoce con el nombre comercial de Antiflus- Des. Está indicado para casos de infecciones por virus de La Influenza A, que cursan en forma similar al resfriado común con mucha tos, fiebre y síntomas congestivos nasales. ¿Para qué sirve el dextrometorfano con guaifenesina y clorfenamina? Esta combinación se usa en caso de síntomas respiratorios con tos y secreciones bronquiales. En las farmacias similares en México puede solicitarlo con el nombre de Co-Exaliv. ¿Para qué sirve la fenilefrina con clorfenamina y paracetamol? Esta combinación es muy similar a la clorfenamina compuesta, pero sin cafeína. Está indicada en casos de resfriado común o gripe con síntomas nasales, estornudos, congestión y fiebre. ¿Para qué sirve la clorfenamina en jarabe 50 mg/100 ml? La clorfenamina en jarabe tiene el mismo efecto antialérgico que en tabletas, cápsulas o ampollas. La ventaja del jarabe es que permite una fácil dosificación de acuerdo al peso y edad en casos de niños o adultos mayores que ameritan dosis más bajas. También es útil en casos de personas con problemas de deglución. Conservación y almacenamiento El medicamento se almacenará a temperatura ambiente lejos del calor y de la humedad. La solución oral no debe congelarse. No se recomendará este ni ningún otro medicamento, aun si los síntomas de la otra persona son similares, pues se puede poner en riesgo la salud del individuo con consecuencias fatales. La dosis olvidada se tomará cuando se recuerde, pero no si la siguiente cantidad está próxima a ser ingerida. Tomar dos dosis seguidas podría poner en riesgo la salud. Interacción con otros medicamentos La interacción de un medicamento con otra sustancia puede ocasionar que los efectos secundarios se intensifiquen o que cambie el efecto del fármaco en el organismo. Se informará al médico si se está bajo tratamiento con otro medicamento, sustancia, complemento vitamínico o producto herbolario. No se aumentará o disminuirá la dosis de ninguna medicina, ni se comenzará a tomar o se suspenderá el uso de otra sustancia, sin antes consultar con el doctor. Los siguientes son contenidos que pueden interactuar con Clorfenamina, como lo revela la Organización Mundial de la Salud en su archivo e interacciones de drogas: (Referencia) Escopolamina. Antiespasmódicos: Atropina, alcaloides, belladona. Antihistamínicos tópicos: spray, crema o ungüento de Difenhidramina. Antidepresivos tricíclicos o medicamentos para tratar el Síndrome de Parkinson: anticolinérgicos tales como benzatropina y Trihexifenidilo. Se revisará la etiqueta de los medicamentos ingeridos pues podrían tener ingredientes que causen somnolencia. De ser así, se consultará con el médico antes de tomar Clorfenamina. Se informará al doctor si se está consumiendo otra sustancia que cause somnolencia como relajantes musculares (Carisoprodol, Ciclobenzaprina), opiáceos o analgésicos contra el dolor (hidrocodona, codeína), marihuana, alcohol, antihistamínicos (Cetirizina, Difenhidramina) o medicamentos para tratar la ansiedad o trastornos de sueño (Lorazepam, Zolpidem, Alprazolam). Estas sustancias podrían interferir con pruebas de laboratorio. Consideraciones importantes Siempre se consultará con el médico si se quiere administrar un medicamento para la tos o el resfriado en un niño. El mal uso de estas medicinas podría provocar consecuencias fatales. No tomar Clorfenamina con alergia a esta sustancia o con próstata agrandada, problemas para orinar, ataques de asma, glaucoma de ángulo estrecho o un bloqueo en el estómago o intestinos. Pacientes con enfermedades del hígado o riñón, asma, enfisema o bronquitis crónica, epilepsia o algún otro desorden que provoque convulsiones, presión arterial alta, hipertiroidismo, enfermedades cardíacas, enfermedad de la arteria coronaria o un tumor en la glándula suprarrenal, consultarán primero con el médico antes de ingerir el compuesto químico. Aunque se considera seguro para el feto, no se administrará este ni ningún otro fármaco, sin antes notificar al médico del embarazo o si se está en lactancia. Algunas suspensiones orales pueden ser endulzadas con fenilalanina. Se revisarán los ingredientes en el envase si se tiene fenilcetonuria. ¿Qué problemas causa la histamina? La histamina provoca los síntomas de una reacción alérgica como estornudos, ojos rojos y llorosos, inflamación, erupciones en la piel y flujo nasal constante. La exposición constante a tipos de alergenos como mariscos, el polen, el pelo de animales y la picadura de insectos, pueden provocar la producción excesiva de histamina en personas sensibles. A sus empleos se suman: Para aliviar la comezón de la irritación en la piel provocada por infecciones virales como varicela. Para tratar la anafilaxis.(Referencia) Si te gustó este artículo compártelo con tus amigos en las redes sociales, para que también conozcan para qué sirve la Clorfenamina y cuáles son sus efectos secundarios. Referencias Tallarida R.J. (1982) Chlor-Trimeton® (Schering). In: TOP 200. Springer, New York, NY. DOI . Organización Mundial de la Salud. Section 3: Antiallergics and Medicines Used in Anaphylaxis. 1-64. Disponible en: www.who.int/selection_medicines/committees/expert/19/applications/Histamine_3_AC_R.pdf. Rumore M. Clinical Pharmacokinetics of Chlorpheniramine. Annals of Pharmacotherapy. 1984;18(9):701-707. . Kar S, Krishnan A, Preetha K, Mohankar A. A review of antihistamines used during pregnancy. Journal of Pharmacology & Pharmacotherapeutics. 2012;3(2):105-108. Disponible en: Simons FE, Fraser TG, Maher J, Pillay N, Simons KJ. Central nervous system effects of H1-receptor antagonists in the elderly. Ann Allergy Asthma Immunol. 1999;82(2):157-60.Disponible en: Millet VM, Dreisbach M, Bryson YJ. Double-blind controlled study of central nervous system side effects of amantadine, rimantadine, and chlorpheniramine. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 1982;21(1):1-4. Disponible en: . De Abajo F, Montero D, Madurga M, García L. Acute and clinically relevant drug-induced liver injury: a population based case-control study.2004;58(1):71-80. British Journal Medical Pharmacology. . Soper JW, Chaturvedi AK y Canfield DV. Prevalence of chlorpheniramine in aviation accident pilot fatalities, 1991-1996. Aviat Space Environ Med. 2000;71(12):1206-9. Disponible en: . Hao L., Liu M, Wen Q, Hu Z, Brunson E, Johnson J & Almoazen H. Evaluation of Chlorpheniramine Maleate microparticles in orally disintegrating film and orally disintegrating tablet for pediatrics. Drug Development and Industrial Pharmacy. 2014; 40:7, 910-918, Disponible en: . Organización Mundial de la Salud. Apéndice 1: Interacciones. Formulario Modelo de la OMS 2004. 413-482. Disponible en: . 23-Julio-2024 Equipo Medicover Medicina General En el mundo de los medicamentos de venta libre, el jarabe de maleato de clorfeniramina se destaca como una solución versátil y eficaz para el tratamiento de diversas afecciones alérgicas. Este artículo profundiza en los beneficios del jarabe de maleato de clorfeniramina, explorando sus usos, especialmente en niños y bebés, y aportando información completa sobre su eficacia y aplicación. Entendiendo el maleato de clorfeniramina El maleato de clorfeniramina es un antihistamínico que se usa comúnmente para aliviar los síntomas de alergia, como secreción nasal, estornudos, picazón y ojos llorosos. Actúa bloqueando la histamina, una sustancia del cuerpo que provoca síntomas alérgicos. El maleato de clorfeniramina está disponible en varias formas, incluidas tabletas y jarabes, lo que lo hace accesible para personas de todas las edades. Maleato de clorfeniramina 4 mg La dosis de 4 mg de maleato de clorfeniramina se encuentra entre las concentraciones más utilizadas. Esta dosis es eficaz para adultos y niños mayores de 12 años y proporciona alivio de los síntomas de alergia durante hasta 4 a 6 horas. La forma de jarabe, en particular, es beneficiosa para quienes tienen dificultades para tragar comprimidos. Usos del jarabe de maleato de clorfeniramina El jarabe de maleato de clorfeniramina es muy eficaz en el tratamiento de una variedad de afecciones, especialmente en niños y bebés. A continuación, exploramos los usos principales de este medicamento. Rinitis alérgica La rinitis alérgica, comúnmente conocida como fiebre del heno, es una afección frecuente que afecta tanto a niños como a adultos. Los síntomas incluyen estornudos, secreción nasal y ojos que pican. El jarabe de maleato de clorfeniramina puede proporcionar un alivio rápido de estos síntomas, lo que lo convierte en una solución de referencia durante la temporada de alergias. Resfriado comun Aunque el maleato de clorfeniramina es un antihistamínico, también es eficaz para aliviar los síntomas del resfriado común. Al reducir la congestión y la irritación nasal, ayuda a mejorar la respiración y la comodidad general durante un resfriado. Alergias de la piel El jarabe de maleato de clorfeniramina también se puede utilizar para tratar alergias cutáneas, como urticaria o dermatitis de contacto. Al bloquear la acción de la histamina, ayuda a reducir la picazón y la hinchazón asociadas con estas afecciones. Jarabe de maleato de clorfeniramina para niños Cuando se trata de tratar a niños, los padres suelen preferir el jarabe de maleato de clorfeniramina debido a su facilidad de administración y eficacia. Aquí hay algunos puntos clave a considerar: Dosis para niños La dosis para niños varía según la edad y el peso. Es fundamental seguir las pautas de dosificación recomendadas proporcionadas por un profesional de la salud. Por lo general, a los niños de 2 a 6 años se les puede recetar una dosis más baja, mientras que a los de 6 a 12 años se les puede recetar una dosis más alta, pero sin exceder el límite máximo diario. Seguridad y precauciones Si bien el jarabe de maleato de clorfeniramina es generalmente seguro para los niños, es esencial respetar la dosis prescrita y no usarlo durante períodos prolongados sin consultar a un médico. El uso excesivo o incorrecto puede provocar efectos secundarios como somnolencia, mareoy sequedad de boca. Jarabe de maleato de clorfeniramina para bebés Para los bebés, a menudo se considera el jarabe de maleato de clorfeniramina cuando otros tratamientos no son adecuados. Sin embargo, es vital consultar a un pediatra antes de administrar este medicamento para garantizar que sea seguro para el bebé. Medicamentos combinados: bromhidrato de dextrometorfano y jarabe de maleato de clorfeniramina En algunos casos, el maleato de clorfeniramina se combina con otros ingredientes activos, como el bromhidrato de dextrometorfano, para mejorar su eficacia. El dextrometorfano es un supresor de la tos que ayuda a reducir la tos, lo que hace que el jarabe combinado sea beneficioso para tratar tanto los síntomas de alergia como la tos. Beneficios de los jarabes combinados Los jarabes combinados brindan un enfoque más integral para el tratamiento de afecciones respiratorias. Al abordar múltiples síntomas simultáneamente, ofrecen comodidad y un mejor manejo de los síntomas, particularmente en niños que pueden tener dificultades para tomar múltiples medicamentos. Usos de la tableta de maleato de clorfeniramina Si bien este artículo se centra en la forma de jarabe, vale la pena señalar que las tabletas de maleato de clorfeniramina también se usan ampliamente. Las tabletas ofrecen una opción conveniente para adultos y niños mayores que pueden tragar pastillas. Los usos de las tabletas de maleato de clorfeniramina son similares a los del jarabe, incluido el tratamiento de rinitis alérgica, resfriado comuny alergias en la piel. Dosificación y administración La dosis de las tabletas de maleato de clorfeniramina suele oscilar entre 2 mg y 4 mg, y se toman cada 4 a 6 horas, según sea necesario. Es importante seguir la dosis prescrita y no exceder el límite diario recomendado para evitar posibles efectos secundarios. Si bien el jarabe de maleato de clorfeniramina es generalmente seguro cuando se usa según las indicaciones, es importante estar consciente de los posibles efectos secundarios. Los efectos secundarios comunes incluyen: Somnolencia Mareo Boca seca Náuseas En casos raros, pueden producirse efectos secundarios más graves, como dificultad para respirar o reacciones alérgicas graves. Si se experimenta alguno de estos síntomas, es fundamental buscar atención médica de inmediato. Precauciones Se deben tomar ciertas precauciones al utilizar jarabe de maleato de clorfeniramina: Evite el consumo de alcohol, ya que puede aumentar la somnolencia. Usar con precaución en personas con antecedentes de asma u otras afecciones respiratorias. Consulte a un profesional de la salud antes de usarlo en mujeres embarazadas o en período de lactancia. El jarabe de maleato de clorfeniramina es un medicamento valioso para controlar diversas afecciones alérgicas, especialmente en niños y bebés. Su eficacia para aliviar los síntomas de la rinitis alérgica, el resfriado común y las alergias cutáneas lo convierte en una solución de elección para muchos padres y proveedores de atención médica. Además, la combinación de maleato de clorfeniramina con bromhidrato de dextrometorfano ofrece un enfoque integral para el tratamiento de afecciones respiratorias. Al comprender el uso, la dosis y los posibles efectos secundarios adecuados, puede incorporar de forma segura y eficaz el jarabe de maleato de clorfeniramina al régimen de atención médica de su familia. Consulte siempre a un profesional de la salud antes de administrar cualquier medicamento, especialmente a niños y bebés, para garantizar la seguridad y eficacia. Tu salud lo es todo: prioriza tu bienestar hoy. Programe su cita Preguntas Frecuentes El jarabe de maleato de clorfeniramina se usa comúnmente para aliviar los síntomas de afecciones alérgicas como la fiebre del heno, la rinitis alérgica y la urticaria (ronchas). También puede ayudar a aliviar los síntomas del resfriado común. El maleato de clorfeniramina se puede utilizar en niños, pero se debe administrar con precaución y según las recomendaciones del pediatra, ya que las dosis varían según la edad. El maleato de clorfeniramina se usa en medicamentos para la tos para ayudar a aliviar la tos asociada con alergias y resfriados al reducir la irritación en la garganta y las vías respiratorias. No se recomienda utilizar maleato de clorfeniramina durante el embarazo a menos que lo recete un médico. Siempre consulte con un médico antes de usar cualquier medicamento durante el embarazo. Las personas con ciertas condiciones médicas como glaucoma, agrandamiento de la próstata, enfermedad hepática grave o sensibilidad a los antihistamínicos deben evitar el maleato de clorfeniramina. Siempre consulte a un médico antes de usar. El jarabe de maleato de clorfeniramina no debe usarse en niños menores de 6 años a menos que lo indique específicamente el médico. La dosis debe ajustarse cuidadosamente según la edad y el peso del niño. La clorfeniramina generalmente se considera segura para personas con función renal normal. Sin embargo, las personas con enfermedad renal grave deben consultar a un médico antes de usar clorfeniramina. Descargo de responsabilidad: La información proporcionada en este documento es precisa, actualizada y completa según las mejores prácticas de la Compañía. Tenga en cuenta que esta información no debe tratarse como un reemplazo de la consulta o el consejo médico físico. No garantizamos la exactitud y la integridad de la información así proporcionada. La ausencia de cualquier información y/o advertencia sobre cualquier medicamento no se considerará ni se asumirá como una garantía implícita de la Compañía. No asumimos ninguna responsabilidad por las consecuencias que surjan de la información antes mencionada y le recomendamos encarecidamente una consulta física en caso de cualquier consulta o duda. Nombre generico: Chlorpheniramine And Dextromethorphan Clase de droga: Combinaciones respiratorias superiores Uso de Chlorpheniramine and dextromethorphan La clorfeniramina es un antihistamínico. El dextrometorfano es un supresor de la tos. La clorfeniramina y el dextrometorfano es una medicina combinada que se usa para tratar los estornudos, la secreción nasal y la tos causadas por el resfriado común. También se pueden usar clorfeniramina y dextrometorfano. para fines no mencionados en esta guía del medicamento. Busque ayuda médica de emergencia si tiene signos de una reacción alérgica: urticaria; respiración difícil; hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta. Deje de usar clorfeniramina y dextrometorfano y llame a su médico de inmediato si tiene somnolencia intensa. Efectos secundarios como boca seca, el estreñimiento y la confusión pueden ser más probables en los adultos mayores. Los efectos secundarios comunes de la clorfeniramina y el dextrometorfano pueden incluir: mareos , somnolencia; sequedad de boca, nariz o garganta; estreñimiento; Clorfeniramina-dextrometorfano, 1 mg-5 mg, tableta oral, masticable:>=6 =6 =6 Advertencias No use este medicamento si ha usado un inhibidor de la MAO en los últimos 14 días, como isocarboxazida, linezolid, inyección de azul de metileno, fenelzina, rasagilina, selegilina o tranilcipromina. No utilice medicamentos para la tos o el resfriado para adormecer al niño. ¿Qué otras drogas afectarán? Chlorpheniramine and dextromethorphan Evite usar este medicamento con otros medicamentos que causen somnolencia o lentitud en la respiración (como medicamentos opioides, relajantes musculares o medicamentos para la ansiedad o las convulsiones). Consulte a un médico o farmacéutico antes de usar cualquier otro medicamento, incluidos medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y productos a base de hierbas. No todas las posibles interacciones medicamentosas se enumeran en esta guía de medicamentos. Se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información proporcionada por Drugslib.com sea precisa, hasta -fecha y completa, pero no se ofrece ninguna garantía a tal efecto. La información sobre medicamentos contenida en este documento puede ser urgente. La información de Drugslib.com ha sido compilada para uso de profesionales de la salud y consumidores en los Estados Unidos y, por lo tanto, Drugslib.com no garantiza que los usos fuera de los Estados Unidos sean apropiados, a menos que se indique específicamente lo contrario. La información sobre medicamentos de Drugslib.com no respalda medicamentos, ni diagnostica a pacientes ni recomienda terapias. La información sobre medicamentos de Drugslib.com es un recurso informativo diseñado para ayudar a los profesionales de la salud autorizados a cuidar a sus pacientes y/o para servir a los consumidores que ven este servicio como un complemento y no un sustituto de la experiencia, habilidad, conocimiento y criterio de la atención médica. practicantes. La ausencia de una advertencia para un determinado medicamento o combinación de medicamentos de ninguna manera debe interpretarse como una indicación de que el medicamento o la combinación de medicamentos es seguro, eficaz o apropiado para un paciente determinado. Drugslib.com no asume ninguna responsabilidad por ningún aspecto de la atención médica administrada con la ayuda de la información que proporciona Drugslib.com. La información contenida en este documento no pretende cubrir todos los posibles usos, instrucciones, precauciones, advertencias, interacciones medicamentosas, reacciones alérgicas o efectos adversos. Si tiene preguntas sobre los medicamentos que está tomando, consulte con su médico, enfermera o farmacéutico. Palabras clave populares La clorfeniramina se presenta en forma de tabletas y cápsulas normales, tabletas de liberación prolongada (acción prolongada) y cápsulas de liberación prolongada, tabletas masticables y líquido, para administrarse por vía oral. Por lo común, las cápsulas y las tabletas normales, las tabletas masticables y el líquido se toman cada 4 a 6 horas, según sea necesario. En general, las tabletas y las cápsulas de liberación prolongada (acción prolongada) se toman dos veces al día, por la mañana y por la noche, según sea necesario. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su médico o farmacéutico cualquier cosa que no comprenda. Tome la clorfeniramina exactamente como se lo indicaron. No tome una cantidad mayor ni menor del medicamento ni lo tome con más frecuencia de lo que indica la receta de su médico.La clorfeniramina viene sola y en combinación con reductores de la fiebre y del dolor, expectorantes, supresores de la tos y descongestivos. Pregúntele a su médico o a su farmacéutico cuál es el producto más indicado para sus síntomas. Lea detenidamente las etiquetas de los medicamentos de venta sin receta contra la tos y el resfriado antes de usar dos o más productos al mismo tiempo. Estos productos pueden contener los mismos ingredientes activos, de modo que tomarlos juntos podría causarle una sobredosis. Esto es particularmente importante si le va a dar medicamentos contra la tos y el resfriado a un niño.Los productos combinados de venta sin receta para la tos y el resfriado, entre ellos los que contienen clorfeniramina, pueden provocarles efectos secundarios graves e incluso mortales a los niños de corta edad. No dé estos productos a niños menores de 4 años. Si les da estos productos a niños de 4 a 11 años, hágalo con precaución y siga al pie de la letra las indicaciones del envase.Si le está dando clorfeniramina o un producto combinado con difenhidramina a un niño, lea detenidamente la etiqueta del envase para cerciorarse de que sea un producto adecuado para la edad del niño. No les dé a los niños productos con clorfeniramina que están hechos para adultos.Antes de darle un producto con clorfeniramina a un niño, consulte la etiqueta del envase para ver qué cantidad de medicamento debe proporcionarle. Dé la dosis que coincida con la edad del niño en la tabla. Pregúntele al pediatra si tiene dudas sobre cuánto medicamento darle al niño.Si está tomando el líquido, no use una cuchara de cocina para medir la dosis. Use la cuchara o la taza medidora que viene con el medicamento, o use una cuchara diseñada especialmente para medir medicamentos.Si está tomando las tabletas o las cápsulas de liberación prolongada, tráguelas enteras. No las parta, triture, mastique ni abra. El medicamento clorfeniramina es un antihistamínico que ayuda a reducir los efectos de la histamina química natural en el cuerpo. La histamina provocará síntomas como estornudos, picazón, ojos llorosos y secreción nasal. Las tabletas de clorfeniramina se utilizan para tratar Rinorrea, Estornudos Picazón y Ojos llorosos que son causados por diversas reacciones alérgicas, el resfriado común y la gripe. Usos de clorfeniramina La clorfeniramina es un antihistamínico que alivia síntomas como enrojecimiento, picazón, ojos llorosos, estornudar y secreción nasal causada por alergias, fiebre y resfriado común. Actúa bloqueando la acción de la histamina, una sustancia del cuerpo responsable de los síntomas alérgicos. La clorfeniramina no pretende acelerar la recuperación sino más bien controlar los síntomas. No se recomienda el uso de productos para la tos y el resfriado en niños menores de 6 años sin indicación médica. Es posible que determinadas formulaciones de acción prolongada no sean adecuadas para niños menores de 12 años. Siga cuidadosamente las instrucciones de dosificación para minimizar el riesgo de efectos secundarios graves. Evite administrar otros medicamentos para la tos y el resfriado que contengan ingredientes similares para evitar posibles interacciones medicamentosas. Consulte a un médico o farmacéutico sobre métodos alternativos para aliviar la tos y los síntomas del resfriado, como hidratación y gotas/aerosoles salinos nasales. Algunos de los efectos secundarios comunes de la clorfeniramina son: Algunos de los efectos secundarios graves de la clorfeniramina son: Problemas de la vista Dificultad para orinar Si experimenta síntomas graves, comuníquese con su médico de inmediato. Si tiene alguna reacción adversa a la clorfeniramina, evite usarla. En la mayoría de los casos, los beneficios de este medicamento superan los efectos secundarios y los efectos secundarios graves son poco comunes. Sin embargo, busque asistencia médica de inmediato si experimenta algún efecto secundario grave. Precauciones al tomar clorfeniramina Antes de tomar clorfeniramina, consulte con su médico si es alérgico a ésta o a algún otro medicamento. El medicamento puede contener algunos ingredientes inactivos que pueden causar algunos problemas graves en su cuerpo. Hable con el médico si está tomando algún medicamento con y sin receta, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas. Si tiene alguno de los siguientes problemas, como resfriados, fiebre , alergias, ansiedad y depresión. Hable con el medicamento si tiene alguna de las siguientes enfermedades: Asma Enfisema Bronquitis crónica enfermedad pulmonar Glaucoma Úlceras Diabetes Dificultad para orinar. Tu salud lo es todo: prioriza tu bienestar hoy. Programe su cita Mantenga una lista completa de todos los medicamentos, incluidos los productos recetados, sin receta y a base de hierbas, y discútalos con su médico y farmacéutico. Siempre busque la aprobación de su médico antes de comenzar, suspender o ajustar la dosis de cualquier medicamento. Informe a su médico sobre cualquier producto que pueda interactuar con la clorfeniramina, como los antihistamínicos aplicados en la piel y los medicamentos que causan somnolencia, como los analgésicos opioides, los analgésicos para la tos, el alcohol y la marihuana. ¿Cómo tomar Clorfeniramina? La clorfeniramina está disponible en varias formas, incluidas tabletas, cápsulas, tabletas de liberación prolongada, tabletas masticables y líquidos. Las cápsulas, tabletas y líquidos habituales deben tomarse cada 4 a 6 horas, según sea necesario. Las tabletas de liberación prolongada generalmente se toman dos veces al día, por la mañana y por la noche, según sea necesario. Es importante seguir las instrucciones de dosificación proporcionadas en la etiqueta de la receta y consultar a su médico si necesita alguna aclaración. La clorfeniramina se puede combinar con analgésicos y fiebre, expectorantes, supresores de la tos y descongestionantes para mejorar su eficacia. Consulte a su médico para que le aconseje sobre el mejor uso de los medicamentos para obtener resultados óptimos. Evite administrar a niños productos de clorfeniramina destinados a adultos y asegúrese de que la dosis coincida con la edad del niño como se indica en la tabla. Los productos combinados para la tos y el resfriado de venta libre que contienen clorfeniramina pueden presentar riesgos graves para los niños pequeños, incluida la muerte. Nombre de la marca : Clorfeniramina, Tussin para diabéticos Nombre generico : Clorfeniramina Clase de droga: Atihistaminas, 1.ª generación Tabletas: 4 mg, 8 mg, 12 mg Jarabe : 2 mcg/ 5 ml Suspensión : 2 mg/mL para adultos Comprimidos/jarabe: 4 mg por vía oral cada 4-6 horas Tabletas de liberación prolongada: 8 mg por vía oral cada 8-12 horas Cápsulas de liberación prolongada: 12 mg por vía oral una vez al día Cápsulas de liberación sostenida: 8-12 mg por vía oral cada 8-12 horas de intervalo. pediatría Niños mayores de 12 años: Comprimidos o jarabe: 4 mg por vía oral cada 4-6 horas; no exceda los 24 mg / día Comprimidos de liberación prolongada: 8 mg por vía oral cada 8 a 12 horas o 12 mg cada 12 horas; no exceda los 24 mg / día Cápsulas de liberación prolongada: 12 mg por vía oral una vez al día; no exceda los 24 mg / día geriatría 4 mg por vía oral una vez al día o cada 12 horas Liberación sostenida 8 mg por vía oral antes de acostarse Evite su uso en ancianos debido a la alta incidencia de efectos anticolinérgicos. Eliminación reducida con la edad avanzada, mayor riesgo de confusión, sequedad de boca, estreñimiento y otros efectos anticolinérgicos y toxicidad. La sobredosis de un medicamento puede ser accidental. Si ha tomado más tabletas de clorfeniramina de las prescritas, existe la posibilidad de que tenga un efecto nocivo en las funciones de su cuerpo. La sobredosis de un medicamento puede provocar alguna emergencia médica. La falta de dosis Omitir una o dos dosis de clorfeniramina generalmente no tiene ningún efecto en el cuerpo y no causa ningún problema. Sin embargo, para algunos medicamentos, la dosis oportuna es crucial para su eficacia. Si omite una dosis, su médico puede recomendarle tomarla lo antes posible para evitar cambios químicos repentinos en el cuerpo. Este medicamento contiene clorfeniramina. No tome ChlorTrimeton o Diabetic Tussin si es alérgico a la clorfeniramina o a cualquier ingrediente contenido en este medicamento. Embarazo y lactancia. Utilice clorfeniramina con precaución durante el embarazo si los beneficios superan los riesgos. Los estudios en animales muestran riesgos y no hay estudios en humanos disponibles o no se realizaron estudios en animales o humanos. Se desconoce la excreción de clorfeniramina en la leche. Storage Guarde la clorfeniramina lejos del calor, el aire y la luz para evitar daños y posibles efectos nocivos. Manténgalo fuera del alcance de los niños y guárdelo a temperatura ambiente entre 68ºF y 77ºF (20ºC y 25ºC). Antes de tomar clorfeniramina, consulte a su médico y busque atención médica inmediata si experimenta algún efecto secundario. Cuando viaje, lleve sus medicamentos en su bolso para estar preparado para emergencias. Siga siempre su receta y los consejos de su médico cuando tome clorfeniramina. Clorfeniramina vs cetirizina Citaciones Neuroimagen funcional de la cognición alterada por un antihistamínico clásico, la d-clorfeniramina Se administra por vía oral o por inyección intravenosa, intramuscular o subcutánea en forma de maleato de clorfeniramina.Nombre genérico: maleato de clorfeniramina.Usos de la clorfeniraminaLa clorfenamina se usa en el tratamiento de:Los síntomas de afecciones alérgicas, como